

## اطلاعیه سازمان غذا و دارو و هشدار در خصوص عدم مصرف سوم آفتکش کشاورزی جهت درمان شپش سر

بر اساس گزارشات دریافتی از همکاران محترم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، متاسفانه چند مورد مسمومیت حاد و حتی مرگ ناشی از استفاده موضعی سوم آفتکش کشاورزی (دیازینون از دسته سوم ارگانوفسفره) به منظور درمان شپش سر کودکان مشاهده شده است.

در همین راستا، دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو، هشدار می‌دهد در صورت برخورد با افراد مبتلا به شپش، خصوصاً کودکان که این آلودگی در ایشان شایع تر است، ضمن مراجعه به پزشک و داروساز و تهیه شامپوها و لوسيون‌های مخصوص درمان شپش موجود در داروخانه‌ها و استفاده بر اساس توصیه‌های اعلام شده، به هیچ عنوان از سوموم دفع آفات و حشرات مانند سوموم کشاورزی و یا سوموم خانگی، برای دفع شپش استفاده نکنید. سوموم دفع آفات نباتی مورد استفاده در کشاورزی، دارای سمیت بالایی می‌باشد و شدیداً از طریق پوست قابل جذب هستند و تماس پوستی با این سوموم می‌تواند منجر به مسمومیت و مرگ شود. به طوری که حتی از کشاورزان درخواست می‌شود ضمن انجام سم پاشی مزاع، از دستکش لاستیکی، کفش لاستیکی جلو بسته و ماسک حفاظت کننده استفاده نمایند تا از بروز مسمومیت ناشی از تنفس و یا تماس سم با پوست پیشگیری شود.

ضمن ابراز تاسف از بروز این حادثه غم انگیز، از عموم مردم خصوصاً ساکنین مناطق روستایی و کشاورزی که به سوموم دفع آفات دسترسی دارند، درخواست می‌شود توصیه‌های پیشگیرانه را جدی بگیرند و برای درمان شپش و موارد مشابه، فقط به پزشک و داروساز مراجعه نمایند و به هیچ عنوان از سوموم دفع آفات و سوموم خانگی جهت درمان شپش استفاده نشود.

دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت

سازمان غذا و دارو

تابستان ۱۴۰۱